

Tabelle 1 | Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene; 2021

| Impfung | Alter in Wochen | Alter in Monaten | | | | | | | | | Alter in Jahren | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|----|------|---|-----------------|------------------|----|-------|----|-----------------|-----------------|--------|-----------------|------|--------|----|-----------------|-----------------|----------------|
| | | 6 | 2 | 3 | 4 | 5–10 | 11 ^{*c} | 12 | 13–14 | 15 | 16–23 | 2–4 | 5–6 | 7–8 | 9–14 | 15–16 | 17 | ab 18 | ab 60 | |
| | U4 | | | U5 | | | U6 | | | U7 | | | U7a/U8 | U9 | U10 | U11/J1 | J2 | | | |
| Rotaviren | G1 ^a | | G2 | (G3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tetanus ^b | | G1 | | G2 | | G3 ^c | | | | | | | A1 | | A2 | | | A ^e | | |
| Diphtherie ^b | | G1 | | G2 | | G3 ^c | | | | | | | A1 | | A2 | | | A ^e | | |
| Pertussis ^b | | G1 | | G2 | | G3 ^c | | | | | | | A1 | | A2 | | | A3 ^e | | |
| Hib ^b – <i>H. influenzae</i> Typ b | | G1 | | G2 | | G3 ^c | | | | | | | | | | | | | | |
| Poliomyelitis ^b | | G1 | | G2 | | G3 ^c | | | | | | A1 | | | | | | | | |
| Hepatitis B ^b | | G1 | | G2 | | G3 ^c | | | | | | | | | | | | | | |
| Pneumokokken ^b | | G1 | | G2 | | G3 ^c | | | | | | | | | | | | | S ^g | |
| Meningokokken C | | | | | | | G1 | | | | | | | | | | | | | |
| Masern | | | | | | G1 | | | | G2 | | | | | | | | | | S ^f |
| Mumps, Röteln | | | | | | G1 | | | | G2 | | | | | | | | | | |
| Varizellen | | | | | | G1 | | | | G2 | | | | | | | | | | |
| HPV – Humane Papillomviren | | | | | | | | | | | | G1 ^d | | G2 ^d | | | | | | |
| Herpes zoster | | | | | | | | | | | | | | | | | | G1 ^h | G2 ^h | |
| Influenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | S (jährlich) | | |

 Empfohlener Impfzeitpunkt

 Nachholimpfzeitraum für Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. für Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

Erläuterungen

G Grundimmunisierung (in bis zu 3 Teilimpfungen G1–G3)

A Auffrischimpfung

S Standardimpfung

- a Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen
- b Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen
- c Mindestabstand zur vorangegangenen Impfstoffdosis: 6 Monate
- d Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich
- e Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung
- f Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit
- g Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff
- h Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten
- * Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden